

Гады, собранные среднеазиатскими экспеди-
ціями проф. В. В. Сапожникова въ 1902—6 и
1908 гг.

Профессора Императорскаго Томскаго Университета

Н. О. Кащенко.

[N. Th. Kaščenko. Les reptiles et amphibiens, pris par les expédi-
tions 1902—6, 1908 du prof. V. V. Sapozhnikov dans l'Asie centrale].

(Представлено 4 февраля 1909 г.).

1. *Testudo horsfieldii* GRAY.

1) Солончаковая степь на р. Караталь (Копальскій уѣздъ),
между могилами Науманъ-мулла и Учъ-мулла. 8 мая 1902 г.

2. *Tropidonotus tesselatus* LAUR.

1) Долина Конуруленъ, Тянь-шань, Терскей-тау (Иссыкъ-
куль). 1 іюня 1902, 7 экз.

2) Рѣчка Чеганъ-тогой въ горахъ Барлыкъ. 1 іюля 1904.
На этикетѣ записано: „эта змѣя замѣчена въ рѣчкѣ, съ рыбой
въ $\frac{1}{4}$ арш. во рту, которую держала поперекъ. Отъ шума при
купаніи она спряталась въ нору, въ яру надъ самой водой, от-
куда и извлечена“.

Общая длина 95 см., брюшныхъ чешуй 178.

3. *Tropidonotus natrix* L.

1) Укр. Бахты, 29 іюня 1904.

2) Тараты (Монгольскій Алтай), 9 августа 1906.

3) Г. Сара-сумбе, между 9 и 12 авг. 1906. Молодой экз.

4. *Zamenis ravergeri* MÉNÉTR.

1) Буамское ущелье, между Джиль-арыкь и Кокь-муйнакь, Александровскій хребетъ. 27 мая 1902.

5. *Coluber dione* PALLAS.

1) Дол. Конуруленъ, Тянь-шань, Терскей-тау. 1 июня 1902. Два экз.

2) Безъ этикета. Судя по датамъ препаратовъ, вмѣстѣ съ которыми этотъ экземпляръ былъ завернутъ, вѣроятно, близъ ст. Георгиевской, въ концѣ мая 1904 г. Молодой экз.

3) Кара-Иртышъ, 1 авг. 1906.

4) Р. Чингиль, 30 іюля 1906. Въ передней половинѣ туловища четыре продольныя темныя полосы, въ задней — рѣзко выраженные поперечныя черныя полосы.

6. *Coluber dione* var. *quattuorlineatus* LACER.

1) Берегъ Енисея близъ с. Новоселова, между Красноярскомъ и Минусинскомъ. Августъ 1903.

2) Г. Кобдо, 16 іюля 1906.

3) Тараты, Монгольскій Алтай, 9 авг. 1906. Съ обѣихъ сторонъ только по одному предглазничному щитку (маленькаго подглазничнаго нѣтъ).

7. *Taphrometopon lineolatum* BRNDT.

1) Уроч. Алмалы, степь, Копальск. уѣзда, 25 апрѣля 1902.

8. *Eryx jaculus* L.

1) Ст. Чунджи, Джаркентск. уѣзда, 16 іюля 1902.

2) Тамъ же, 17 іюля 1902.

3) Горы Барлыкь, 1 іюля 1904.

9. *Ancistrodon halys* PALL.

1) Сел. Нарынъ-колъ, Тянь-шань. 11 іюля 1902.

2) Дол. Конуруленъ, Тянь-шань. Терскей-тау. 1 июня 1902.

3) С. Усинское, Усинскій округъ: Саяны, августъ 1903. Два экземпляра, оба не типичные для этого вида. У одного съ

одной стороны 8, съ другой 7 верхнегубныхъ щитковъ; у другого съ обѣихъ сторонъ по 7. Рыльце, однако, вздернутое отчетливо у обоихъ экземпляровъ.

4) Спускъ къ р. Алабай въ горахъ Сауръ. 10 іюня 1904. Типичный представитель вида.

5) Спускъ къ р. Чабаръ-талъ въ вост. част. Джунгарскаго Алатау. 7 іюля 1904. Съ правой стороны 7 верхнегубныхъ.

6) Джунгарскій Алатау, восточный конецъ р. Теректы у выхода въ дол. оз. Алакуль. 4 іюля 1904. Съ обѣихъ сторонъ по 8 верхнегубныхъ. Рыльце слабо вздернуто.

10. *Ancistrodon intermedius* STRAUCH.

1) Лѣв. бер. рч. Баянкола выше сел. Нарынъ-коль, Тянь-шань. 7 іюля 1902.

2) Дол. Конуруленъ, Тянь-шань, Терскей-тау. 1 іюня 1902.

3) Окр. гор. Пржевальска. Рч. Караколь. 10 іюня 1902.

4) Джунгарскій Алатау, первый станъ въ верховья р. Тентекъ. 10 іюля 1904.

5) Вост. часть Джунгарскаго Алатау. Долина „невидимой“ р. Улонду. 6 іюля 1904.

11. *Vipera berus* L.

1) Г. Сара-сьюмбе. 9—12 августа 1906. Два экземпляра, изъ которыхъ одинъ взрослый обыкновеннаго сѣраго цвѣта, другой молодой желтовато-коричневаго цвѣта (*var. cherssea* L.).

12. *Vipera renardi* CHRISTOPH.

1) Горы Барлыкъ. 1 іюля 1904. Надростральныхъ щитковъ два. Спинная темная полоса только въ передней части (на протяженіи около 2 стм.) и вблизи хвоста (на протяженіи около 3 стм.) подраздѣлена на пятна, притомъ не вполнѣ. Общій цвѣтъ свѣтло-желтовато-оливковый.

2) Рахмановскіе ключи, Русскій Алтай. 24 іюля 1905. Такіе же признаки, но цвѣтъ болѣе темный, коричнево-оливковый.

3) Чичканъ-ту, Монгольскій Алтай. 5 авг. 1906.

13. *Agama sanguinolenta* PALL.

1) Станц. Чуньджа, Джаркентск. уѣзда. 16 іюля 1902.

14. *Phrynocephalus mystaceus* PALL.

- 1) Лѣв. бер. рѣки Каратала, уроч. Тасъ-тологой, Копальск. уѣзда. 29—30 апр. 1902. Пять экземпл.
- 2) Уроч. Кангай, Копальск. уѣзда. 3 мая 1902. Три экземпл.

15. *Phrynocephalus helioscopus* PALL.

- 1) Уроч. Алмалы Копальск. уѣзда. 25 апр. 1902. Два экз.
- 2) Между уроч. Алмалы и Джаманъ-кора, Копальск. уѣзда. 25 апр. 1902. Три экз.
- 3) Близъ оз. Ала-куль. 3 іюля 1904. Два экз.
- 4) Уроч. Мукуртай къ зап. отъ оз. Улюнгуръ, Западная Монголія, 21 іюня 1908. Тринадцать экз.

16. *Phrynocephalus helioscopus* var. *saposhnikovi* n.

A forma typica squamis pectoris, superficiei supernae femorum tibiarumque distincte carinulatis distinguitur.

- 1) Степь близъ Каратальскаго поста, въ дол. Черн. Иртыша. 8 іюля 1904. Семь экземпляровъ.
- 2) Долина Эмиля. 1 іюля 1904. Четыре экз.

Вариация эта отличается отъ типичной формы тѣмъ, что у первой чешуя на груди съ явственными ребрышками и съ вытянутыми въ шипики концами. Чешуя на верхней сторонѣ бедра и голеней также съ явственными ребрышками.

17. *Phrynocephalus helioscopus levis* n. subsp.

Phrynocephalo helioscopo typico minor. Asperitas squamarum dorsalium parum distincta. Tarsus posticus in $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ longior quam tibia. Color generalis concinne pallide-griseus. Dorsum maculis albis regularibus nigrocinctis fasciisque obscuris parum distinctis ornatum.

- 1) Близъ таможеннаго Каратальскаго поста, въ дол. Черн. Иртыша. 8 іюня 1904. Два экземпл.
- 2) Тамъ же. 7 іюня 1904. Четыре экземпляра.

Эти экземпляры, уже по общему виду значительно отличающіеся отъ типичной формы *Phryn. helioscopus*, я принимаю пока за подвидъ, хотя возможно, что современемъ ихъ придется

совершенно выдѣлится въ самостоятельный видъ. Особенности этого новаго подвида заключаются въ слѣдующемъ.

Шереховатость спинныхъ чешуекъ выражена несравненно слабѣе, чѣмъ у типичной формы. Отдѣльныя, неправильно разбросанныя, торчащія кверху чешуйки лишь слабо выдаются надъ общею поверхностью чешуи. Грудныя чешуйки на концахъ вытянуты въ короткіе шипики. Ребрышки на чешуйкахъ верхней стороны бедеръ и голеней явственны. Кисть задней ноги значительно длиннѣе голени (на $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$). Размѣры всего тѣла меньше, чѣмъ у *Phr. helioscopus*. Общій цвѣтъ красивый, свѣтло-сѣрый. Верхняя сторона всего тѣла дымчато-сѣраго цвѣта, съ красивымъ довольно правильнымъ узоромъ изъ небольшихъ бѣлыхъ пятенъ, часто съ черной каймой, и слабо замѣтныхъ широкихъ поперечныхъ темныхъ полосъ (не всегда ясно выраженныхъ). Хвостъ сверху съ такими же слабо выраженными поперечными полосами, снизу съ двумя-тремя неправильными черными поперечными полосами и съ чернымъ концемъ. У нѣкоторыхъ экземпляровъ на нижней сторонѣ хвоста замѣтны слѣды краснаго цвѣта. Въ остальномъ этотъ подвида сходенъ съ основной формой. Размѣры въ миллиметрахъ: длина головы 13,5; дл. тѣла (отъ конца рыльца до задняго прохода) 50, дл. хвоста 55, дл. голени 12, дл. кисти задней ноги 16.

Упомянутая выше вариация (*Phr. hel. var. saposhnikovi*) является до нѣкоторой степени переходной формой между типичнымъ *Phryn. helioscopus* и его подвидомъ *subsp. levis*.

18. *Scapteira grammica* Лиснт.

1) Уроч. Кангай, Копальск. уѣзда, прибалхашскіе пески. 29 апр. 1902. Три экзempl.

2) Ст. Илійская, Джаркентск. уѣзда. 18 іюля 1902.

19. *Eremias arguta* Pall.

1) Дол. Конурулена, Тянь-шань, Терскей-тау, 1 іюня 1902. Четыре экзemplара.

2) Уроч. Аякъ-тюбе, Копальск. уѣзда. 25 апр. 1902. Четыре экзempl.

3) Устье ущ. Кастекъ, Заилійскій Алатау. 23 мая 1902. Два экзempl.

- 4) Зап. бер. оз. Иссыкъ-куль. 28 мая 1902.
- 5) Выс. Охотничій, сѣв. подн. Тянь-шаня. 8 іюля 1902.
- 6) Около озера Ала-куль. 3 іюля 1904.
- 7) Каирты, Монгольск. Алтай. 31 іюля 1906.

20. *Eremias velox* PALL.

- 1) Чуньджа, Джаркентскій уѣздъ. 16 іюля 1902.
- 2) Ст. Илійская, Джаркентск. уѣздъ. 18 іюля 1902. Два экземпляра, изъ которыхъ одинъ молодой.
- 3) Джаркентъ. 21 іюля 1902. Молодой экз.
- 4) Уроч. Мукуртай къ зап. отъ озера Улюнгуръ, Западная Монголія. 21 іюня 1908.

21. *Eremias multiocellata* GÜNTHER.

- 1) Зап. бер. оз. Иссыкъ-куль. 28 мая 1902.
- 2) Станц. Кутемалды, берегъ оз. Иссыкъ-куль. 28 мая 1902. Два экзempl.

22. *Lacerta vivipara* JACQ.

- 1) Р. Бухтарма, ниже Берельскаго. 22 іюня 1905. Четыре экзempl.
- 2) Курту, 4 августа 1906.
- 3) Быстрый истокъ, май 1906.
- 4) Безъ указанія мѣста, 1906 г. Одна взрослая и три молодыхъ.

23. *Lacerta agilis* var. *exigua* EICHW.

- 1) Уроч. Бурханъ, Джаркентск. уѣзда, 26 іюля 1902. Три экземпляра.
- 2) Уроч. Сауранъ-мулла, Копальск. уѣзда, 7 мая 1902.
- 3) Ст. Нарынколъ (Охотничій), Джаркентск. уѣзда. 9 іюля 1902. Два экз.
- 4) Тепл. ключи Арасанъ въ горахъ Барлыкъ. 2 іюля 1904.
- 5) Бахты. 27 іюня 1904. Два экз.
- 6) Каратальскій таможенный постъ, долина Чернаго Иртыша бл. оз. Зайсанъ. 6—8 іюня 1904. Три экз.
- 7) Безъ указанія мѣста. 1906. Одна взрослая и три молодыхъ.

24. *Lacerta agilis* var. *kurtuana* n.

A forma typica et a var. *exigua* EICHW. statura tenui gracili-que, trunco capiteque minoribus, sed cauda longiore (haec trunco cum capite fere duplo longior) et tarso longo (hic tibiâ fere duplo longior) distinguitur. Inter scutis temporalibus unum saepe ceteris multo majus.

- 1) Ст. Георгіевское, Семипалатинск. обл. Степь. 25 мая 1904. Два экз.
- 2) Базарка, Семипалат. обл. Степь. 26 мая 1904.
- 3) Бахты. 27 іюня 1904. Четыре экз.
- 4) Между р. Чингиль и Хоро-шаро въ Монгольскомъ Алтаѣ. 29—31 іюля 1906. Семь экз.
- 5) Курту, въ Монгольскомъ Алтаѣ. 4 августа 1906. Шесть экземпляровъ.
- 6) Айгулакъ, въ русскомъ Алтаѣ. 4 іюня 1906.
- 7) Р. Б. Каирты, въ Монгольскомъ Алтаѣ. 2 августа 1906.
- 8) Уроч. Мукуртай, къ зап. отъ оз. Улюнгуръ, въ западн. Монголіи. 21 іюня 1908. Два экз.

Эта вариация отличается отъ своего основного вида, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ var. *exigua*, тонкимъ изящнымъ строеніемъ, длиннымъ хвостомъ (который почти вдвое длиннѣе туловища съ головой), тонкими длинными пальцами и длинной стопой, которая почти вдвое длиннѣе голени. Голова и вообще все тѣло меньше и стройнѣе, чѣмъ у var. *exigua*, хотя общая длина приблизительно такая же, потому что хвостъ очень длиненъ. Особенно замѣтна разница въ толщинѣ основной части хвоста: у var. *kurtuana* онъ гораздо тоньше. Чешуекъ вокругъ середины тѣла 38—43, не считая брюшныхъ. Между височными щитками часто одинъ (средній) гораздо больше другихъ. По окраскѣ и по числу фрэнальныхъ и назифрэнальныхъ щитковъ такъ же варьируетъ, какъ и var. *exigua*.

Я пока не придаю этой формѣ значенія самостоятельнаго вида только потому, что въ однихъ и тѣхъ же мѣстахъ иногда попадаются какъ типичные ея представители, такъ и переходные къ var. *exigua*. Название вариации произведено мною отъ одного изъ мѣстъ ея нахождения.

Размѣры въ миллиметрахъ.

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
Длина тѣла (съ голо- ловой)	62	82	63	85	75	75	80	55	68
Длина хвоста . . .	118	128	100	130	147	130	135	95	130
Длина голени . . .	9	10	8,5	10,5	—	—	—	—	—
Длина стопы . . .	16	19	15,5	18	—	—	—	—	—

25. *Ablepharus saposhnikovi* n. sp.

Abl. kucenkoi Nik. affinis, sed distinctus: 1) pedes anteriores posterioresque inter se apicibus versis saepissime cohaerentes, 2) cauda trunco cum capite multo longior et 3) scutum interparietale longitudine fere scuto frontoparietali cuilibet aequale. Superficies dorsalis olivacea, vittis duabus latis obscuris nonnullisque seriebus longitudinalibus striarum nigrarum albarumque ornata. Superficies interna pallide coerulea.

1) Рч. Карагайтѣ, притокъ р. Сарыджасъ, Пржевальск. уѣзда. (Тянь-шань). 2 іюля 1902. Три экземпляра, найденные, какъ гласитъ надпись на этикетѣ, „подъ камнями“.

2) Прав. бер. р. Сарыджасъ, Пржевальск. у., при устьѣ Куелю (Тянь-шань). 1 іюля 1902. Два экз.

Лобно-носовой щитокъ на значительномъ протяженіи касается межчелюстного и лобнаго. Предлобные щитки не касаются другъ друга, будучи разъединены передней третью лобнаго щитка, который далѣе назадъ касается 1-го и 2-го надглазничныхъ. Длина лобнаго щитка значительно превышаетъ общую длину лобно-темяннаго и межтемяннаго, взятыхъ вмѣстѣ (дл. лобнаго 3,4; дл. послѣднихъ 2,3, въ миллиметрахъ). Лобно-темянныхъ щитковъ два. Межтемянной по величинѣ приблизительно равенъ одному изъ лобно-темянныхъ. Надглазничныхъ три; изъ нихъ первые два почти равны (первый самый длинный, а второй самый широкій). Глазъ окруженъ двумя (а на немногихъ отдѣльныхъ мѣстахъ—тремя) рядами мелкихъ щитковъ, причемъ всѣ щитки внутренняго ряда приблизительно равны между собой, а между щитками наружнаго ряда ясно выдѣляются своей величиной два-четыре, расположенные надъ глазомъ. Изъ этихъ щитковъ два внутренніе больше крайнихъ. Четыре губныхъ предшествуютъ подглазничному. На пер ед

немъ краю небольшого овальнаго слуховаго отверстія находится 3—4 зубчика, изъ которыхъ одинъ обыкновенно бываетъ развитъ сильнѣе другихъ. Спинныя чешуйки немного больше брюшныхъ и боковыхъ. Вокругъ средней части тѣла помѣщается 26—27 чешуй. Передъ заднимъ проходомъ лежатъ двѣ крупныя чешуйки.

Переднія и заднія ноги, будучи вытянуты по направленію другъ къ другу, обыкновенно едва соприкасаются между собой концами пальцевъ. Этотъ признакъ, однако, подверженъ колебаніямъ и, повидимому, находится въ соотношеніи съ возрастомъ. У одного экземпляра, въ 104 мм. общей длины, между концами пальцевъ протянутыхъ другъ къ другу переднихъ и заднихъ ногъ остается промежутокъ, равный длинѣ ступни. У двухъ другихъ (въ 98 и 96 мм. общей длины) пальцы тѣхъ и другихъ едва касаются, а у двухъ молодыхъ (въ 70 мм. общей длины) заднія и переднія ноги вполнѣ соприкасаются концами пальцевъ.

Хвостъ длиннѣе туловища съ головой (при измѣреніи отъ задняго прохода), какъ можно видѣть изъ слѣдующей таблицы:

Въ миллиметрахъ.

Общая длина	104	98	96	70
Длина туловища съ головой	49	45	43	33
Длина хвоста	55	53	53	37

Цвѣтъ сверху оливковый, съ четырьмя продольными рядами черныхъ черточекъ, окаймленныхъ по бокамъ бѣлыми пятнышками. По бокамъ, вдоль всего тѣла, проходятъ двѣ широкія темныя полосы, испещренныя болѣе свѣтлыми черточками, а сверху отграниченныя узкой непрерывной свѣтлой полоской. Брюшная сторона свѣтлаго голубого цвѣта.

Этотъ видъ ближе всего подходитъ къ *A. kusenkoï* Nikol'ski, но отличается слѣдующими признаками: 1) ноги обыкновенно соприкасаются, 2) хвостъ значительно длиннѣе туловища съ головой, 3) окраска тѣла иная, 4) относительными размѣрами межтемяннаго щитка (у *A. kusenkoï* онъ замѣтно меньше каждаго изъ лобно-темянныхъ) и, наконецъ, 5) у моего вида лобно-носовые и межтемянной щитки имѣютъ значительно большіе размѣры, по сравненію съ сосѣдними щитками, чѣмъ это наблюдается у *A. kusenkoï*.

26. *Bufo viridis* LAUR.

1) Ущ. Буамское, между Кокъ-муйнакъ и Кутемалды, Александровскій хребеть. 28 мая 1902. Три экземпляра.

2) Верхн. теченіе рѣки Кокъ-су, Джунгарскій Алатау, Копальск. уѣздъ. 2 августа 1902.

3) Близъ выс. Охотничьяго, Джаркентск. уѣзда, сѣверное подножіе Тянь-шаня. 12 іюля 1902.

4) Устье р. Улахоль, притока оз. Иссыкъ-куль. 30 мая 1902.

5) Безъ этикета. Молодой экз.

6) Рѣка Алмалы, Копальск. уѣзда. 24 апр. 1902. Очень крупный экземпляръ. Отъ конца рыльца до задняго прохода, въ прямолинейномъ направленіи (при измѣреніи циркулемъ), 81,5 мм.

7) Укр. Бахты. 26 іюня 1904.

8) Дол. р. Теректы, при выходѣ въ дол. Алакуля. 5 іюля 1904. Три молодые экземпляра.

9) Уроч. Мукуртай, къ западу отъ оз. Улюнгуръ, Западная Монголія. 21 іюня 1908.

27. *Bufo* sp. (*B. viridis unicolor* n. var.?).

A forma typica colore uniformi dorsi griseo-olivaceo tincto immaculato distinguitur.

1) Ст. Кокъ-муйнакъ, 27 мая 1902.

По общимъ размѣрамъ тѣла, по ширинѣ лба, формѣ паротидъ, по относительной длинѣ первыхъ двухъ пальцевъ передней конечности, по непарному бугорку на четвертомъ суставѣ самага длиннаго пальца ноги, — этотъ экземпляръ совершенно сходенъ съ *B. viridis*. Но спина однообразнаго сѣраго цвѣта, съ оливково-зеленоватымъ оттѣнкомъ, безъ характерныхъ для этого вида зеленыхъ пятенъ. Бородавки и конусовидные сосочки на нихъ (съ черно-бурыми кончиками) чрезвычайно рѣзко выдаются. На ногахъ, особенно заднихъ, слабо замѣтны поперечныя болѣе темныя пятна.

Въ виду извѣстнаго непостоянства признаковъ у центрально-азиатскихъ представителей *B. viridis*, указаннымъ особенностямъ, конечно, невозможно придавать видового значенія.

28. *Rana arvalis* NILSS.

- 1) Ст. Георгіевское (Чарскій трактъ), степь. 25 мая 1904.
- 2) Правый берегъ Бухтармы, ниже впаденія Колмачихи, 19 іюня 1905.
- 3) Г. Сара-сюмбе, въ Монгольскомъ Алтаѣ. 9—12 августа 1906 г.

29. *Rana altaica* KASTSCHENKO.

- 1) Устье р. Улахоль (притокъ оз. Иссыкъ-куль). 30 мая 1902. Три экземпляра.

30. *Rana bachtyana* n. sp.

In sectionem *R. temporariae* LINNAEI pertinet, sed ab omnibus speciebus sectionis nunc cognitis vitta temporali nigropicea deficiente palpebrisque pertenuibus distinguenda. Tuberculus plantaris internus digito correspondente triplo brevior et a lateribus valde compressus, ut formam lamellae perpendicularis fere ubique aequicrassae praebet.

- 1) Укр. Бахты. 27 іюня 1904. Одинъ экземпляръ, самка.

Хотя я избѣгаю описаній новыхъ видовъ по одному только экземпляру, однако, этотъ экземпляръ чрезвычайно трудно отнести къ какому бы то ни было изъ нынѣ извѣстныхъ видовъ линнеевской группы *R. temporaria*, къ которой онъ несомнѣнно принадлежитъ. Наиболѣе характерныя особенности этого экземпляра заключаются, 1) въ чрезвычайной узости вѣкъ, 2) въ своеобразной формѣ внутренняго пяточного бугорка и 3) въ почти полномъ отсутствіи очень характерной для всей группы темной височной полосы. Дальнѣйшіе признаки заключаются въ слѣдующемъ.

Передній край отверстій хоанъ приходится нѣсколько впереди передняго края сошниковыхъ зубовъ, которые имѣютъ видъ двухъ прямыхъ линій, расположенныхъ подъ прямымъ угломъ другъ къ другу. Рыльце тупое. Пространство между вѣками много шире каждаго изъ вѣкъ. Барабанная перепонка явственна; ширина ея составляетъ около $\frac{2}{3}$ ширины глаза. Длина перваго пальца переднихъ ногъ равна длинѣ втораго. Пальцы заднихъ ногъ снабжены перепонкой до $\frac{2}{3}$ своей длины.

Сочленовые бугорки на нижней сторонѣ пальцевъ развиты слабо. Внутренній пяточный бугорокъ очень высокъ и сильно сжатъ съ боковъ, такъ что имѣетъ видъ вертикально стоящей пластинки почти одинаковой толщины на всемъ своемъ протяженіи. Длина его въ три раза меньше длины соотвѣтственнаго пальца. Внешній пяточный бугорокъ не замѣтенъ. Задняя нога, будучи вытянута впередъ, пяткой достигаетъ конца рыльца.

Общій цвѣтъ свѣтло-желтовато-бурый. Темнаго височнаго пятна почти нѣтъ (неясные слѣды его замѣтны только сзади уха). На спинѣ находятся отдѣльныя чернобурья пятна, расположенныя длинною своею осью вдоль тѣла, и три параллельныя свѣтлыя полосы, происходящія вдоль всего тѣла. Средняя изъ нихъ оканчивается впереди глазъ, а обѣ боковыя доходятъ только до головы. На бокахъ тѣла короткія продольныя, а на верхней сторонѣ конечностей поперечныя черно-бурья пятна. Вся брюшная поверхность безъ пятенъ.

Размѣры въ миллиметрахъ: длина тѣла (съ головой) 59, дл. задней ноги до конца пальцевъ 90, длина внутреннего пяточного бугорка 2, дл. соотвѣтственнаго пальца 6,5; ширина промежутка между вѣтками 3,5; ширина вѣтка 2.

Повидимому, всего ближе этотъ видъ стоитъ къ *R. temporaria* var. *asiatica* Бедв., отъ которой, однако, отличается малой шириной вѣтокъ, формой пяточного бугорка, болѣе тупымъ рыльцемъ и почти полнымъ отсутствіемъ височной полосы.

