



# Twee dagen beestjes zoeken rond Polleur

Alex Bakker  
Mondlanestr. 4  
2332 ZE Leiden

## INLEIDING

Begin juni 1986 werd een twee dagen durende excursie naar het in de Ardennen gelegen Polleur gemaakt. De weersomstandigheden tijdens dit bezoek waren gunstig, namelijk veel zon en een hoge luchttemperatuur, zodat er naast amfibieën ook reptielen te vinden waren. De gevonden dieren zijn gerangschikt per biotoop.

## DE BEEK BOVEN DE CAMPING

In een ijskoude, boven de camping gelegen beek, die uitmondt in het enige honderden meters lager gelegen riviertje, werd de eerste waarneming gedaan. Het betrof hier vuursalamanderlarven (*Salamandra salamandra terrestris*). Deze dieren werden vooral 's nachts massaal gezien, in een kwartier zo'n zestig dieren. In de begroeiing bij de beek vonden we juveniele bruine kikkers (*Rana temporaria*).

## HET BOS BIJ DE BEEK

In dit bos, dat voornamelijk uit loofhout bestaat, zagen we twee hazelwormen (*Anguis fragilis*). De dieren werden gevonden bij het omdraaien van op de grond liggende voorwerpen. Het grootste exemplaar, met een lengte van ongeveer 30 centimeter, was een drachtig vrouwtje en werd gevonden in een mierennest. Vermoedelijk consumeerde zij hier de mierepoppen. Het tweede exemplaar, een mannetje (bij de vangst stak het dier een hemipenis uit), werd onder een stronk gevonden en was overdekt met littekens. In deze biotoop werden in diepe plassen eveneens vuursalamanderlarven gevonden. Ook bevond zich in dit gebiedje een

vijver waar 's morgens een naar lucht happende, mannelijke alpenwatersalamander (*Triturus alpestris*) werd gezien. Na naarstig verder zoeken werden alleen maar enige verwoed om zich heen happende libellelarven gevonden.

Maar de grootste wens was volwassen vuursalamanders te zien. We vonden ze in een voor deze soort zeer merkwaaardige biotoop, namelijk een open veld in het bos. Het was er droog, de grond was bedekt met loof, stenen, stronken en een heleboel afgestorven varenbladeren. In totaal werden acht vuursalamanders gevonden. Ook werd er een jonge levendbarende hagedis (*Lacerta vivipara*) gezien. Adulten werden evenwel niet gevonden. Er werd nog wel een alpenwatersalamander gevonden.

## ÉTANG DU RI DE CHAVION

Bij deze vijver zag ik vijf grote gewone padden (*Bufo bufo*) toen ik hier 's nachts over de weg reed. Ook werd hier in de vijver een dode vinpootsalamander (*Triturus helveticus*) gevonden.

## DE HAUTES FAGNES

De Hautes Fagnes is een prachtig veenlandschap en ligt in de buurt van Polleur. Het bestaat uit moerassen, kleine poeltjes en beken. Het geheel wordt afgewisseld met vele grote pollen gras. Hier werden op graslandjes vele levendbarende hagedissen gezien, sommige zelfs zwemmend. Er waren ook drachtige wijfjes bij. In de omgeving van de hagedissen waren vaak bruine kikkers te vinden.

## DE POEL

In een nabijgelegen boerengehucht werd een poel bezocht. Deze was ongeveer zestig vierkante meter groot en aan een kant overschaduwde door wilgen. De begroeiing in het water bestond uit fonteinkruid, waterpest, kroos en riet. Toen er met netten gevist werd kwamen er twaalf kamsalamanders (*Triturus cristatus*) te voorschijn. Prachtige dieren met een oranje-zwart gevlekte buik. Er waren enkele zeer grote vrouwtjes bij en verder mannetjes in volle kleurenpracht. Ook werden er een paar alpenwatersala-

manders gevonden waarvan het mannetje in bronskleed was. Tot slot raakten er nog enige gewone watersalamanders (*Triturus vulgaris*) in mijn net verzeild. De mannetjes waren eveneens in bruiloftskostuum met een blauwgezoomde staart.

## TWO DAYS IN POLLEUR (BELGIUM)

During two days in June 1986 in Polleur (Belgian Ardennes), the following species were observed: *Salamandra salamandra terrestris*, *Triturus alpestris*, *T. cristatus*, *T. helveticus*, *T. vulgaris*, *Bufo bufo*, *Rana temporaria*, *Anguis fragilis* and *Lacerta vivipara*.



## Kweek met de Texas rattenslang (*Elaphe obsoleta lindheimeri*)

Hans v.d. Eerden  
Kempkeshoeve 43  
5262 NV Vught

### VERSPREIDING

De Texas rattenslang komt voor in de U.S.A. vanaf de rivieren de Pearl en de Mississippi naar het westen door Louisiana tot in centraal Texas. Het is een slang die zich in allerlei biotopen thuisvoelt. Hij wordt gevonden in moerasgebieden, bossen, rivierdalen en in rotsachtige gebieden.

### BESCHRIJVING

De maximumlengte van deze rattenslang is 215 cm. Het is een gevlekt dier met meestal weinig contrast tussen de vlekken en de grondkleur. De vlekken zijn bruinig of zwart. De grondkleur is

grijs tot geelachtig. De kop is vaak zwart. Op de huid tussen de schubben en ook op de rand van de schubben kan een rode kleur aanwezig zijn. Er zijn veel individuele verschillen in kleur en tekening.

De jongen hebben grote donkere vlekken op een grijze ondergrond. Ze hebben een duidelijke streep tussen de ogen en een van het oog tot de mondhoek. Door kleur en tekening zijn de jongen van *E.o.lindheimeri* makkelijk te onderscheiden van de jongen van andere ondersoorten van *E.obsoleta*. Ook zijn ze wat robuuster van bouw.