


Lacerta galloti DUMERIL & BIBRON, 1839. Lagarto tizón.

DESCRIPCION. Cuerpo de aspecto rechoncho. Morro largo y obtuso. Rostral no rodeando la cavidad nasal. Una sola postnasal. Cinco supralabiales anteriores a la subocular. Una serie de gránulos entre las supraoculares y las supraciliares. Occipital grande. Masetérica y timpánica distintas. Supratemporales de pequeño tamaño. Pliegue gular señalado. De 40 a 46 escamas gulares y de 9 a 13 escamas en el collar. Escamas dorsales muy pequeñas, aquilladas, en número de 84 a 105 en el centro del cuerpo. De 12 a 14 series longitudinales y de 29 a 31 series transversales de ventrales. De 23 a 31 poros femorales a cada lado y de 29 a 37 laminillas bajo el cuarto dedo. El colorido varía mucho, pero en general es muy oscuro. Las hembras y jóvenes tienen dos bandas claras a cada lado bordeadas de negro y pardo. En la garganta alternan bandas longitudinales claras y oscu-

ras. Inferiormente son negruzcos. Los machos adultos son completamente negros, con ocelos azules en los costados. En otros hay bandas transversales verdosas sobre el costado. En cada isla hay una forma distinta con tamaño y colorido diferente. Las poblaciones de Hierro y Gomera tienen clara tendencia al melanismo total.

LONGITUD TOTAL. Hasta 300 mm.

BIOLOGIA. Extraordinariamente abundante, al menos en la isla de Tenerife, el lagarto tizón se adapta muy bien a medios variados y lo mismo se encuentra en las laderas del Teide y en las Cañadas que en los islotes costeros ((Roques de Anaga). Su régimen alimenticio es casi exclusivamente vegetariano, complementado con insectos. Hasta ahora ha sido calificado como plaga dañina y combatido como tal. De gran voracidad, prefiere los tomates y uvas, sin desdeñar las flores y hojas de las plantas ornamentales. Se ha intentado erradicarlo con veneno o colocando trampas en las tapias, pero por paradójico que parezca es en estos sitios donde más abunda. El lagarto tizón es muy territorial y he visto a los machos perseguirse y morder al contrin-





Lagarto tizón (*Lacerta galloti*)

cante que penetra en el territorio. Al igual que el lagarto canarión, inclina la cabeza hacia arriba, mostrando su garganta negra. Otro rasgo sorprendente es que hinchan la garganta y emiten un gruñido sordo similar al chirrido de un gozne mal engrasado. Los datos concernientes a su reproducción se desconocen.

DISTRIBUCION. Endémico de las islas de Tenerife, Gomera, La Palma y Hierro. Solamente falta en las zonas ocupadas por la laurisilva y en su distribución altitudinal alcanza los 3200 metros en el Teide.
