

# *Psammodromus algirus algirus*

(Linnaeus, 1758)

Cast.: Lagartija colilarga

Val.: Sargantana de cua llarga



J.C. Monzo

119



**CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS:** Lagartija de mediano tamaño. Hasta unos 30 cm de longitud total, de los que aproximadamente dos tercios corresponden a su larga cola. De coloración parda u olivácea, con dos bandas amarillentas a cada lado. En periodo de celo los machos presentan una coloración rojo-anaranjada a los lados de la cabeza.

**COSTUMBRES:** Diurna, aunque en verano se pueden observar individuos por la noche. Terrestre, pero puede trepar a los árboles y arbustos. Suele refugiarse en la base de la vegetación. Activa en los meses templados, principalmente en primavera y cálidos. En ocasiones no hiberna siempre y cuando las temperaturas no sean muy bajas.

**HÁBITAT:** Se puede localizar en zonas muy variadas de nuestro término, como en zonas de pinar, matorral y cultivos abandonados. Por nuestros campos es relativamente frecuente.

**ALIMENTACIÓN:** Básicamente insectívora, aunque también consume otros artrópodos como arañas.

**REPRODUCCIÓN:** En primavera y verano. Entre los meses de marzo a julio acontece la puesta que se compone de 3 a 11 huevos que eclosionan a finales del verano.

**LEGISLACIÓN:** Especie de interés faunístico (endemismo ibero-norteafricano). Presenta el estatus de "No Amenazada" en España pero está catalogada como especie de "Interés Especial" en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 439/1990). "Especie Protegida" por el Convenio de Berna (1979).

**NOTAS COMPLEMENTARIAS:** Como otros muchos saurios, a veces se desprende de su propia cola para entretener al enemigo y mientras tanto, ponerse a salvo (capacidad de autotomía). En determinadas circunstancias, por ejemplo al prenderla, puede emitir un agudo chillido.



S. Peiro

