

*Podarcis filfolensis-maltensis*-  
Männchen aus den Maglio  
Gardens in Floriana.

# Die Malta-Eidechse

*Podarcis filfolensis* gehört zu den weniger bekannten europäischen Arten. Rätsel im Vorkommen auf Malta und Abgrenzungsprobleme gegenüber *Podarcis wagleriana* machen deutlich, dass längst nicht alle Fragen um die Malta-Eidechse gelöst sind.

Von Uwe Schlüter

Die Malta-Eidechse, *Podarcis filfolensis* (Bedriaga, 1876), gehört zu der 17 Arten umfassenden, im südlichen Europa und in Nordwestafrika verbreiteten Gattung *Podarcis* (Mauereidechsen). Meist werden die folgenden fünf Unterarten anerkannt:

- *Podarcis filfolensis filfolensis* (Bedriaga, 1876) von der 2,34 Hektar großen Filfla-Insel südlich von Malta,
- *Podarcis filfolensis generalensis* (Gulia, 1914) von dem ungefähr 0,25 Hektar großen Fungus-Felsen in der Dwejra-Bucht westlich von Gozo,

- *Podarcis filfolensis kieselbachi* (Fejervary, 1924) von den rund zwölf Hektar großen St.-Pauls-Inseln in der St.-Pauls-Bucht im Nordwesten Maltas,

- *Podarcis filfolensis laurentimuellieri* (Fejervary, 1924) von den zusammen ungefähr sechs Quadratkilometer großen Pelagischen Inseln Linosa und Lampione und
- *Podarcis filfolensis maltensis* Mertens, 1921 von Malta (246 Quadratkilometer), Gozo (67 Quadratkilometer), Comino (2,6 Quadratkilometer) und Cominotto (rund neun Hektar).

Hinzu kommt die Population von Pantelleria (83 Quadratkilometer), deren systema-

tische Stellung immer noch ungeklärt ist (Bischoff 1986).

## Lebensraum und Verhalten

*Podarcis f. filfolensis* lebt acht Kilometer vor der Südküste Maltas auf einer tafelbergartig aus dem Meer ragenden Kalksteininsel. Die Insel Filfla wurde 1988 unter Naturschutz gestellt, vor allem wegen der dort brütenden Vögel. Trotzdem fahren immer noch Fischer hinüber – und Jäger, um Vögel zu schießen.

Die Vegetation der Insel besteht vorwiegend aus niedrigen Zwergsträuchern. Die Eidechsen sollen oben auf dem Plateau leben,

Überwiegend grünes Männchen (St. John's Cavalier, Valetta).

Unten: Fast netzartig gezeichnetes Männchen von *Podarcis filfolensis maltensis* (St. John's Cavalier, Valetta). Dieser Zeichnungstyp entspricht *P. f. kieselbachi*!

Rechts: Solche Legesteinmauern auf Gozo sind dicht von *P. filfolensis maltensis* bewohnt.



