

*ACANTHODACTYLUS SCUTELLATUS INORNATUS* GRAY 1848

(carte n° 3)

**Description**

La longueur du museau est égale à celle de la partie post-oculaire de la tête ; on compte six plaques labiales supérieures jusqu'au dessous du centre de l'œil ; les écailles dorsales sont carénées ; on compte 20 lamelles sous le quatrième orteil.

**Coloration**

Voici celle d'un exemplaire provenant de Tindouf : le fond est gris bleu ; dorsalement le tégument est orné de petites taches blanches et noires ; les plaques recouvrant la tête sont légèrement brunes.

**Répartition géographique**

Les captures dont nous pouvons faire état proviennent de : Colomb-Béchar, 1939 ; oued Rheriss, 1939 ; Tindouf, 10 avril 1942 (RUNGS et MORALES AGACINO) ; piste de Tabelbala à Zegdou, 7 mars 1950 (PANOUSE).

**Mesures**

Ces mesures sont celles de l'exemplaire de Tindouf.

Longueur totale : 163 mm

Longueur museau-collier : 19 mm

Longueur collier-fente cloacale : 35 mm

Longueur queue : 109 mm

Longueur du membre antérieur : 20 mm

Longueur du membre postérieur : 36 mm

Nombre de pores fémoraux : 20.

GENRE *EREMIAS*

Le genre *Eremias* Wiegmann 1834 est représenté dans le sud du Maroc par deux espèces :

*Eremias guttulata olivieri*, espèce uniformément répartie sur les territoires du sud qui d'ailleurs remonte assez loin au nord.

*Eremias rubropunctata*, forme à vaste répartition africaine qui ne doit qu'effleurer le territoire marocain au sud-est.