

**Lucertola vivipara *Zootoca vivipara* (Jacquin 1787) e
Zootoca carniolica (Mayer et al. 2000)**

La lucertola vivipara è di piccola taglia (20 cm; SVL 6,5 cm), dotata di testa piccola e arti relativamente corti. Si presenta complessivamente bruna, spesso con marcature abbastanza regolari o, nelle femmine, strie chiare o scure. Le parti inferiori sono spesso aranciate con macchioline nere e bianche nella gola. Il collare è piuttosto serrato. Non rari sono gli individui tendenti al melanismo. Questa specie, nota da tempo per essere l'unica della sua famiglia a partorire figli vivi, è anche la più settentrionale della sua famiglia, essendo diffusa da Capo Nord fino ai monti alle soglie del Mediterraneo, Cantabrici, Pirenei, Alpi e Balcani salendo fino a un massimo di 2500 m, in modo particolare laddove l'umidità sia abbastanza elevata. In Italia la sua distribuzione è limitata alla regione alpina e prealpina. Molto vari sono gli habitat in cui è reperibile. Interessante è anche il fatto che, nelle località a clima più mite nelle quali questa specie è ancora reperibile, la ovoviviparità viene persa: in queste popolazioni vengono normalmente deposte le uova che evidentemente hanno a disposizione il tempo necessario per arrivare fino al momento della schiusa. Recentemente popolazioni della Carnia con queste caratteristiche biologiche sono state separate con il nome di *Zootoca carniolica*.



Lucertola vivipara, Małopolska, Polonia (RM)