

7. *Podarces (Eremias) Pylzowi, n. sp.*

Табл. VI, ф. 1.

E. supra rufo-cinerea; subtus albicans, unicolor. Capite supra cum regione utraque temporali nigro vermiculato vel maculato, dorso fasciis longitudinalibus nigris, saepissime interruptis, vel etiam maculis parvis nigris, in series longitudinales dispositis, cauda fasciis longitudinalibus tribus nigricantibus obsoletis, media brevi, lateralibus usque ad apicem productis, ornatis; artubus nigro reticulatis. Capite parvo, trunco fusiformi, cauda elongata; scutello internasali simplici non diviso, frontonasalibus duobus contiguis suboculari utrinque inter duo scutella supralabialia posito, marginem oris attingente; collari libero, vix arcuato, scutellis parvis, squamiformibus, medio vel impari tantum paullo majore, obsito; scutellis abdominalibus parvis in 38 series transversas et 18—22 obliquas, angulo acuto, retrorsum spectanti, convergentes, dispositis; poris femoralibus utrinque 19—20; scutellis tibialibus externae seriei magnis, transverse valde dilatatis, cetera magnitudine triplo vel ipse quintuplo superantibus.

Longitudo totius animalis 147 mm.; capitis cum collo 19 mm.; trunci 37 mm.; caudae 91 mm.

Habitat in deserto Alaschanico, (duo specimina).

Этотъ новый видъ отличается въ другихъ близкихъ къ нему, не принимая во вниманіе окраски и рисунка, замѣтно малой головой, прямымъ, окаймленнымъ весьма мелкими чешуеобразными щитиками

только латинскую діагнозу этого вида, а подробное описаніе и рисунокъ въ герпетологическомъ отдѣлѣ «Путешествія въ Туркестанъ» А. П. Федченко.

Podarces (Eremias) intermedia, n. sp.

E. supra grisea, subtus alba; capite sparsim nigro punctato; dorso medio lineis tribus vel quatuor longitudinalibus saepissime interruptis, nigris, nec non in utroque latere maculis subrotundatis, albis, nigro marginatis, plus minusve distinctis et in tres vel quatuor series longitudinales dispositis, ornato; artubus nigro reticulatis. Capite subelongato, trunco fusiformi, cauda longa; scutello internasali simplici, haud diviso, frontonasalibus duobus contiguis; suboculari utrinque supra tria scutella supralabialia posito, oris marginem non attingente; collari libero, leviter arcuato, scutellis 8—12 majoribus obsito; scutellis gularibus trium parium anteriorum contiguis; scutellis abdominalibus in 28—31 series transversas et 16—18 obliquas, angulo acuto, retrorsum spectanti, convergentes, dispositis; poris femoralibus utrinque 13—15; scutellis tibialibus externae seriei magnis, transverse dilatatis et cetera magnitudine triplo vel ipse quintuplo superantibus.

Longitudo totius animalis 142 mm.; capitis cum collo 19 mm.; trunci 35 mm.; caudae 88 mm.

Habitat in deserto aralo-caspico.

ошейникомъ и въ особенности мелкими щитиками на груди и брюхѣ, расположенными въ 38 поперечныхъ рядовъ, изъ которыхъ самыя длинныя содержатъ до 22 щитиковъ.

Туловище удлинненное, голова маленькая, заканчивается острою, на концѣ закругленною мордою, хвостъ длинный, постепенно къ концу приострающійся и превосходящій голову и туловище, взятые вмѣстѣ, почти на половину длины. Переднія конечности, обращенныя впередъ и придавленные къ туловищу, достигаютъ до ноздрей, заднія, приведенныя въ такое же положеніе, заходятъ за плечо. Междуносовой щитикъ простой, нераздѣльный, имѣетъ ромбическую форму и отдѣленъ отъ переднечелюстного щитика соприкасающимися другъ съ другомъ верхними носовыми щитиками. Лобносовыхъ щитиковъ, какъ у большей части видовъ, два, онѣ соприкасаются другъ съ другомъ на срединѣ морды. Съ каждой стороны находится по два надбровныхъ щитика, составляющихъ вмѣстѣ овальную фигуру, окруженную зернышками, за исключеніемъ задняго конца, гдѣ къ нимъ примыкаетъ маленькій поперечный щитикъ; подглазныи щитикъ помѣщается между двумя верхнегубными и составляетъ часть свободнаго ротоваго края; передъ нимъ находится пять или шесть довольно крупныхъ, а позади три или четыре весьма мелкихъ верхнегубныхъ щитика. Нижній вѣкъ чешуйчатый, виски покрыты зерновидными чешуйками, среди которыхъ стоятъ нѣсколько болѣе крупныхъ. По каждой сторонѣ подбородочнаго щитика имѣется по 8 нижнегубныхъ, а промежутковъ между ними заняты 5-ю парами горловыхъ щитиковъ, изъ которыхъ три переднія пары соприкасаются другъ съ другомъ въ срединной горловой линіи. Чешуйки на основаніи хвоста не много крупнѣе и болѣе плоски, чѣмъ зерновидныя спинныя чешуйки, притомъ онѣ гладки и не представляютъ ребрышекъ. Ошейникъ свободенъ, почти прямой, т. е. едва дугообразный, на заднемъ краѣ покрытъ мелкими чешуеобразными щитиками, изъ которыхъ только средній нѣсколько больше остальныхъ. Брюшныя и грудныя щитики, какъ выше указано, расположены въ 38 поперечныхъ рядовъ, изъ которыхъ самыя длинныя содержатъ не менѣе 22 щитиковъ. Передъ заднимъ проходомъ лежатъ черепицеобразно мелкія и плоскія чешуйки. Бедряныхъ железокъ съ каждой стороны по 19 или 20. Внутренняя сторона голени покрыта щитиками, расположенными въ нѣсколько рядовъ, изъ которыхъ внѣшній состоитъ изъ щитиковъ, весьма расширенныхъ въ поперечномъ направленіи и превосходящихъ по величинѣ, остальные въ 3 или 5 разъ.

Окраска и рисунок. Основной цвѣтъ верхней части тѣла красновато-буровато-сѣрый, похожій на цвѣтъ обыкновеннаго песка; нижняя сторона тѣла бѣловатая. Голова сверху украшена черными тонкими, червеобразными прожилками, которыя на бокахъ головы исчезаютъ за исключеніемъ висковъ, гдѣ онѣ даже довольно толсты. По верхней части туловища проходятъ тонкія черныя продольныя полоски, многообразно и до такой степени часто прерывающіяся, что иногда рисунокъ спины кажется состоящимъ изъ мелкихъ черныхъ пятнышекъ, расположенныхъ въ продольные ряды; по бокамъ тѣла эти полоски или ряды пятнышекъ становятся менѣе ясными и между двумя крайними изъ нихъ тянется отъ пазухи къ пахамъ болѣе или менѣе ясная полоса, сходная по окраскѣ съ нижней частью тѣла. Неясный черный рисунокъ боковъ переходитъ на стороны хвоста, гдѣ болѣе слабѣетъ, такъ что на задней части хвоста остаются только разединенныя крапинки, лежація на заднемъ краѣ отдѣльныхъ хвостовыхъ щитиковъ. Рисунокъ спины переходитъ на основаніе хвоста, являясь здѣсь въ видѣ неясной приостренной къзадѣ широкой полосы. Верхнія части конечностей представляютъ черный или чернобурый рисунокъ, который обыкновенно беретъ такое преобладаніе надъ основнымъ цвѣтомъ тѣла, что верхняя сторона конечностей является черною или чернобурою, испещренною песочно-желтыми круглыми пятнами, неправильно расположенными. Нижняя сторона животнаго совершенно одноцвѣтная, желтовато-бѣлая.

Размѣры. Общая длина 147 мм.; длина головы и шеи, отъ конца носа до задняго края ошейника, 19 мм.; длина туловища 37 и длина хвоста 91 мм.

Мѣстонахожденіе. Два экземпляра этого вида, названнаго въ честь поручика Михаила Александровича Пыльцова, спутника Н. М. Пржевальскаго, добыты въ Ала-шанской пустынѣ.

8. *Podarces (Eremias) Brenchleyi, Günther.*

Eremias Brenchleyi, Günther: Ann. and Mag. Nat. Hist. 4 ser. X, p. 419 и Brenchley. Jottings during the Cruise of H. M. S. Curaçoa among the South Sea Islands in 1865. p. 396, pl. XXII f. A.

Изъ видовъ, у которыхъ подглазной щитикъ помѣщается между двумя верхнегубными и составляетъ часть свободнаго ротоваго края, *E. Brenchleyi* единственный, у котораго междуносовой щитикъ вдоль раздѣленъ на двѣ симметрическія части; вмѣстѣ съ тѣмъ у этого вида имѣется три лобносовыхъ щитика, такъ какъ между