

ANNALI DEL MUSEO CIVICO
DI
STORIA NATURALE
DI GENOVA

PUBBLICATI PER CURA

DI
G. DORIA E R. GESTRO

—
SERIE 2.^a, VOL. II.
(XXII)
—

J
GENOVA

TIPOGRAFIA DEL R. ISTITUTO SORDO-MUTI

1885

tourées de petites écailles carénées, et précédées de trois écailles, une grande, médiane, et deux petites, latérales. *L'ensemble de l'écaillage supérieure de la tête est très élégamment orné, depuis l'internasale, de belles lignes longitudinales ondulées en relief.* La frénale est petite, la préoculaire très-grande, deux fois aussi longue que haute. *Six sus-labiales*; sept sous-labiales, les 4^{ème}, 5^{ème} et 6^{ème} très longues. Des quatre sous-maxillaires de chaque côté, la dernière est presque aussi longue que les trois autres ensemble. Les temporales sont, devant l'oreille, allongées, hexagonales, carénées. L'ouverture de l'oreille est en tout semblable à celle d'*Eremias lugubris*, verticale et taillée en escalier à son bord postérieur. Le collier est formé par six écailles, dont les deux médianes sont les plus larges. Lamelles abdominales en six rangées longitudinales. Au milieu et en arrière des squammes préanales, il y en a une distinguée par sa grandeur. De chaque côté, 20 pores fémoraux. Membres grêles, atteignant, les antérieurs la narine, les postérieurs l'œil.

« La couleur est semblable à celle des variétés connues d'*Eremias lugubris*. Cinq lignes longitudinales blanchâtres, dont la moyenne se bifurque en avant, sur un fond brun clair; entre les lignes, quelques taches blanches irrégulières; les extrémités, à taches blanches sur fond obscur; sur le bord postérieur de la cuisse, une ligne longitudinale, blanc jaunâtre, comme tout le dessous de l'animal.

« Un seul sujet, de Barava, dans le pays des Çomalis, par A. Brenner, un des compagnons de voyage du baron C. v. d. Decken ».

Dans la description précédente, que j'ai reproduite *in-extenso*, j'ai mis en relief les caractères qui me paraissent s'opposer à la réunion spécifique de cette forme avec la précédente.

III. Révision des genres pristidactyles de la famille des Lacertidés.

En 1867, Strauch (*Bull. Ac. S.^t Pétersbourg*, t. IV, p. 408) énumérait sept genres de Lacertidés pristidactyles; mais ce nombre est porté à neuf, si, comme je crois convenable de le faire, on distingue les *Eremias* et les *Scapteira* que Strauch considérait comme simples sous-genres d'un genre unique, et si l'on donne une importance générique au sous-genre *Saurites* Peters (*Monatsb. Ak. Berlin*, (1869) 1870, p. 60), créé, dans le genre *Eremias*, pour une espèce que son auteur avait placée et que Strauch avait laissée dans le genre *Scapteira*. A ces neuf genres, il faut aujourd'hui en ajouter trois: *Holaspis*

Gray (P. Z. S., 1863, p. 152), que l'on supposait américain et pléodonte, tandis qu'il est africain et rentre bien dans le groupe qui nous occupe (*teste* Boulenger, *in litteris*); *Latastia*, récemment décrit par Bedriaga (*Ann. del Museo Civ. di Genova*, v. XX, 1884), et le genre que je viens de décrire.

Voici, disposés en un tableau dichotomique, les principaux caractères distinctifs de ces douze genres. Le caractère des lamelles sous-digitales, lisses ou carénées, me paraissant devoir être subordonné à d'autres, dans la décomposition en genres de la famille des Lacertidés, et afin de mieux montrer les relations qui unissent ces genres les uns aux autres, je n'ai pas cru devoir éliminer les leiodactyles de ce tableau; je me suis contenté de les mentionner entre parenthèses.

LACERTIDÉS.

1	{	Labiales séparées de la narine par une rostro-naso-frénale ou par une naso-rostrale et une naso-frénale . . . 10.
	{	Labiales non séparées de la narine par une ou deux écailles interposées 2.
2	{	Lamelles sous-digitales lisses ou tuberculeuses, mais non carénées (1 naso-rostrale, 1 ou 2 naso-frénales). 3.
	{	Lamelles sous-digitales franchement carénées . . . 6.
3	{	Lamelles sous-digitales parfaitement lisses, en une seule rangée, le doigt étant entièrement enveloppé par seu- lement deux séries de lamelles, une supérieure et une inférieure (<i>Nucras</i> Gray) ⁽¹⁾ .
	{	Lamelles sous-digitales des grands doigts et orteils plus ou moins tuberculeuses, généralement en deux ran- gées, le doigt étant enveloppé par trois rangées de lamelles, une supérieure et deux inféro-laterales . 4.

(1) Je n'ai constaté cette disposition que sur une espèce, la seule que je possédais, *Lac. Delalandei* Milne-Edwards. Il reste à la vérifier sur deux autres, *Lac. tessellata* Smith et *Lac. tenuolata* Smith. La difficulté de trouver un autre caractère pour retirer ces espèces du genre *Lacerta*, dont elles s'éloignent cependant par l'habitat comme par le faciès, me fait admettre, jusqu'à plus ample informé, la validité de celui que j'ai trouvé et dont je me sers ici.

- 4 { Ecailles dorsales petites et sub-égales, plates ou bombées, lisses ou carénées, le plus souvent granuleuses (*Lacerta* Linné).
 { Ecailles dorsales de dimensions comparables à celles des sus-caudales, carénées, imbriquées 5.
- 5 { Des pores inguinaux seulement. Lamelles sous digitales de la dernière paire distinctes et dilatées en disques (*Tachydromus* Daudin).
 { Des pores inguinaux et fémoraux. Lamelles sous-digitales de la dernière paire soudées ensemble et non dilatées (*Algira* Cuvier)⁽¹⁾.
- 6 { (Lamelles sous-digitales à carènes bilatérales et en une seule rangée, le doigt étant entièrement revêtu par deux séries de lamelles, une supérieure et une inférieure. Pores fémoraux n'occupant que la moitié de la longueur de la cuisse). Deux nasofrénales (*Latastia* Bedriaga).
 { Une seule nasofrénale 7.
- 7 { Une double série longitudinale de très grandes écailles sur le milieu du dos et de la queue . *Holaspis* Gray.
 { Ecailles du dos plus ou moins, celles du dessus de la queue absolument homogènes 8.
- 8 { Doigts dentelés latéralement, une série d'écailles aigües et projetées au-dehors s'intercalant, au moins du côté externe, aux deux séries, supérieure et inférieure (Carène triple, la médiane plus forte, sous les doigts et orteils) *Acanthodactylus* Fitzinger.
 { Doigts non dentelés 9.
- 9 { Lamelles ventrales paraboliques, pas plus larges que longues *Ichnotropis* Peters⁽²⁾.
 { Lamelles ventrales rhomboïdales, celles de la rangée médiane de chaque côté au moins deux fois aussi larges que longues (Trois carènes sous les doigts, la médiane plus saillante) . . *Psammodromus* Fitzinger.

(1) Comprenant *Algira* Cuvier, *Notopholis* Fitzinger, *Zerzoumia* Lataste.
 (2) « *Tropidosaurae similis, sed hypodactylia carinata, nares inter scutella tria posita* ». Peters (Berich. Ak. Berlin, 1854, p. 617).

- 10 { Doigts dentelés latéralement (3 nasales, dont une naso-rostrale, une naso-frénale et une rostro-naso-frénale). 11.
- 10 { Doigts non dentelés latéralement 13.
- 11 { Doigts non carénés en dessous 12.
- 11 { Doigts carénés en dessous *Saurites* Peters.
- 12 { Des pores fémoraux. Museau normal. *Scapteira* Fitzinger.
- 12 { Pas de pores fémoraux. Museau dilaté en travers et à bords tranchants . *Pachyrhynchus* Barboza du Bocage.
- 13 { Carène bilatérale sous le doigt. Trois séries de lamelles, une supérieure et deux inférieures, revêtant le doigt. Ecailles dorsales grandes, imbriquées, carénées (3 ou 4 nasales) 14.
- 13 { Une carène médiane sous le doigt. Trois séries de lamelles, une supérieure, une inférieure, une latero-externe, autour du doigt. Ecailles dorsales granuleuses. 15.
- 14 { Paupières rudimentaires *Ophiops* Ménériès.
- 14 { Paupières normales *Cabrita* Gray.
- 15 { Trois nasales, dont une naso-rostrale, une naso-frénale et une rostro-naso-frénale. Trois carènes sous le doigt, la médiane plus saillante. Jambe revêtue, en dessus d'écailles granuleuses comme celles du dos, en dessous de deux rangées de grandes lamelles. *Eremias* Fitzinger.
- 15 { Quatre nasales, dont deux naso-rostrales et deux naso-frénales. Une seule carène sous le doigt. Jambe revêtue, en dessus de grandes écailles carénées et imbriquées, en dessous d'une seule rangée de grandes scutelles *Boulengeria* n. g.

Paris, 3 mai 1885.